


葉ハ稍疎ニ着キ大キク、長サ (2-3-5 mm. 背面ニ深イ一條ノ溝ガアリ、縁部ニハ淡褐色ノ  
 纖毛ガ列生シテキル。残念ナガラ花ハナカツタガ、去年ノ果實ガ殘ツテキテ、果梗ハ長サ  
 7-12 mm. アツタ。西ハばいかる地方カラ東ハおほつく・うすりー地方ニ分布シテキル種類  
 デ、かむちやつか半島ニモ記録ハアルガ誤リラシイ。工藤博士ガ *C. tetragona* トサレタモ  
 ノモ同一ト思フノデ、樺太廳中央試験所報告第一類第一號デ石山哲爾氏ノツケラレタ から  
 ふといハひげヲ和名トシテ採用シテオク。 (原 寛)

*Cassiope ericoides* D. DON in New Philos. Journ. XVII, p. 158 (1834).

Syn. *Andromeda ericoides* PALLAS, Fl. Ross. II, p. 56, t. 73, fig. 3 (1788).

Nom. Jap. *Karafuto-iwähige*.

Hab. Saghalien: in Experimental Forest of Kyushu Imperial University.  
 (H. HARA)



はごろもえぞにはとこ

### ○はごろもえぞにはとこ

(*Sambucus Buergeriana*

BLUME var. *lacera* NAKAI)

1891 年故 FAURIE 師ガ北海道  
 札幌附近デ發見シテ以來久シク  
 採集家ノ目ヲ逃レテキタガ數年  
 前王子製紙會社山林部ノ富本豐  
 氏ニヨツテ膽振國、白老郡、敷  
 生村ノ社有林内デ見出サレタ。  
 細カク切レタ葉ハ、ソノ帶黃白  
 色ノ花或ハ紅色ノ果實ト相俟ツ  
 テ頗ル美事デアル。現在デハ虎  
 杖濱ヘ移植サレ大切ニ保護サレ  
 テキル。 (原 寛)

### ○さはをぐる

飯沼慾齋翁ハ草本圖說ニさは  
 をぐるまトをかをぐるまヲ區別  
 シテ圖解シタガ、牧野博士ガコ  
 ノ兩者ヲ同一デアルトサレテカ  
 ラハズツトソノ様ニ考ヘラレテ  
 キタ。併シ最近筆者ハコノ兩形  
 ガ可成リ異ツテキル事ニ注意ヲ  
 惹カサレタ。さはをぐるまノ基  
 本形ハをかをぐるまニ比シ水分

多イ所ニ生エ全形壯大デ葉ハ細長ク、莖上葉ハ數多ク、花ノ數モ多ク、總苞ノ綿毛ハ少イ。

花期モ遅ク時ニ八月頃開花シテキルノヲ見受ケル。ケレドモソレダケデハさはをぐるまハをかをぐるまノ生態的一形ニ過ギナイト斷定サレテシマツテモ仕方ガナイシ、又以上ノ性質ガ明カデナイ形ノモノモアル。併シ兩者ヲ區別スルモウーツノ差異ハ、をかをぐるまノ瘦果ハ常ニ有毛デアルノニ、さはをぐるまデハ全く無毛ナ事デアル。瘦果ノ性質ガ重視サレル菊科デハコレハ可成リノ違ヒト認メテヨイデアラウ。さはをぐるまヲをかをぐるま(*Senecio integrifolia* (L.) CLAIRVILLE)ノ變種トスルカ別種トスルカハ人ニヨリ意見モ異ルデアラウガ、兎ニ角兩者ガ同一デナイ事ヲ讀者ニ御知ラセスル。別種トスレバ學名ハ *Senecio Pierotii* MIQUEL ヲ採用スレバヨイト思フ。尙をかをぐるまモ隨分形ガ變リ、殊ニ冠毛ノ長サハ時期ニモヨルガ可成リ違フモノガアル。

(原 寛)

### 話ノ種(學名ヲ數ヘタ話)

日本産植物殆ソド全部ガ載ツテ居ルト云フ牧野・根本兩氏著日本植物總覽ハ日頃我等植物仲間ノ机上ニハ無クテカナワヌ本ノーツトナツテ居ル事ハ此處ニ更メテ申ス迄モ無イ事デアル。サテ私ハ或ル日ツレヅレナル儘下宿ノ3階ニ寢コロンデペラペラトコノ本(第2版)ノ頁ヲメクツテ居タノデアル。所ガ種名ヤ變種名ヲ見テ行クト japonicus トカ formosanus 等ト云フ様ナノガ非常ニ頻繁ニ出テ來ル。コレハ一寸數ヘテ見タラドンナモノダラウト、ソコハソレ持前ノ統計まにやト來テ居ル、退屈ナ時間(精神の失業時トデモ申シマセウ)ヲ見ハカラツテ數ヘ上ゲテ見ルト次ノ様ナ事ニナツタ。アマリ大シタ事デモナイガ少シバカリ紙面ヲ拜借スル事ニシタ。尤モ正確サニハ相當自信ガアルノデ若シオ疑ヒノ方ハ一寸數ヘ直シテ見テ下サイ。御承知ノ様ニ種名ニナツタ形容詞ハソノ屬名ノ性ニ從ツテ男、女、中ノ何レカノ性ニ語尾ガ變化シテ居ルガ此處デハ全部男性語尾ニ直ホシタ。

1) 先ヅ第一ニ總數 9,200 幾ツト云フ種名ニ用ヒラレタ單語ハ 4262 通りデアツテ、ソノ中 3111 ハ唯一回宛シカ現ハレナイ。2 回ノモノハグツト減ツテ 472, 3 回ノハ 200 通りト云フ具合。最モ多ク出現スルノハ japonicus (日本ノ)デ 299 回、ツマリ 100 種ノ植物ヲ扱フト 3 種ハ japonicus ト云フ名ガ付イテ居ル勘定ニナリ、サスガハ日本ダト感心スル、次ニ 30 回以上現レル語ヲ舉ゲルト次ノ通り: formosanus (臺灣ノ) 197, nipponicus (日本ノ) 74; chinensis (支那産ノ) 68; Kawakamii (川上氏ノ) 46; arisanensis (阿里山ニ産スル) 42; indicus (インドノ) 40; boninensis (小笠原島産ノ) 35; Tashiroi (田代氏ノ) 33; vulgaris (普通ノ) 33; Fauriei (フオーリー氏ノ) 32; liukuensis (琉球産ノ) 31; kiusianus (九州ノ) 30。

2) 種名ハ大抵形容詞デ造ラレルガ、時ニヨルト古イ屬名ヤソノ植物ノラテン名、ギリシャ名又ハ各地ノ土名ヲソノマ、又ハ少シ變ヘテ使フ事ガアル。コンナノデハ同ジモノガソウザラニ出テ來ル事ハナイ、セイゼイ 2 回位デアル。コレガ 387 通りデ 399 回現ハレル。數デハ全體ノ僅カ 4 分ニシカ當ラナイ。

3) 人ノ名前ノ語尾ヲ細工シテ種名トスル事ハ非常ニ屢々行ハレルモノデアツテ全數ノ 1 割 5 分ヲ占メテ居ル (652 通り 1417 回)。ソノ中 -ii 又ハ i, 或ハ -e (a デ終ル時) ヲ付